

Resumo Número: 18115

Tratamento cirúrgico do hálux valgo através da técnica percutânea de Reverdin-Isham: um estudo retrospectivo de 6,5 anos de seguimento

Fábio Lemos Rodrigues¹, Luiz Carlos Ribeiro Lara¹, Juan Antonio Grajales¹, Lucio Carlos Torres¹

1. Hospital Universitário de Taubaté, Taubaté, SP, Brasil.

RESUMO

Objetivo: Analisar os resultados da correção cirúrgica do hálux valgo através de estudos clínicos e radiográficos utilizando-se a técnica percutânea de Reverdin-Isham.

Métodos: Avaliamos retrospectivamente 43 pés em 38 pacientes, portadores de hálux valgo leve ou moderado, durante o período compreendido entre junho de 2009 a julho de 2018. A média de idade no momento da cirurgia foi de 59 anos; o tempo de seguimento pós-operatório foi, em média, 79 meses. Todos os pacientes submetidos à técnica de Reverdin modificada por Isham foram avaliados no pré e pós-operatório através do escore da *American Association Orthopaedic Foot and Ankle Society* (AOFAS); mensuramos radiograficamente o ângulo do hálux valgo (AHV), o ângulo intermetatársico (AIM) e o ângulo articular distal do primeiro metatársico (AADM).

Resultados: O escore AOFAS teve um aumento médio de 55 pontos. O AHV diminuiu em média 14°, o AIM em 3° e o AADM em 9°. O encurtamento médio do primeiro osso metatársico foi de 0,3cm.

Conclusão: A técnica cirúrgica apresentada mostrou-se eficaz para correção do hálux valgo, demonstrando boa correção angular e aumento expressivo do escore AOFAS.

Palavras-chave: Hálux valgo; Procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos; Osteotomia.

